



PCT/FR 2004/001664

REÇU 04 OCT. 2004

OMPI PCT

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 05 JUL. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr

BEST AVAILABLE COPY



INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

5 bis, rue de Saint Pétersbourg  
5800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354\*03

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 W / 210502

REMISE DES PIÈCES DATE <b>2 JUIL 2003</b>		<b>10</b> NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE  Cabinet BARRE LAFORGUE & associés 95 rue des Amidonniers 31000 TOULOUSE
LIEU <b>31 INPI TOULOUSE</b>		
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI <b>0308042</b>		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>- 2 JUIL. 2003</b>		
Vos références pour ce dossier (facultatif) UN643-BF9789 JP/SF		

Confirmation d'un dépôt par télécopie	<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie
<b>2</b> NATURE DE LA DEMANDE	Cochez l'une des 4 cases suivantes
Demande de brevet	<input checked="" type="checkbox"/>
Demande de certificat d'utilité	<input type="checkbox"/>
Demande divisionnaire	<input type="checkbox"/>
<i>Demande de brevet initiale</i>	N° _____ Date _____
<i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>	N° _____ Date _____
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>	<input type="checkbox"/> N° _____ Date _____

<b>3</b> TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)
NOUVEAUX COMPOSES AROMATIQUES INHIBITEURS DES ALDOLASES, PROCEDE DE SYNTHÈSE ET APPLICATIONS.

<b>4</b> DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation _____ N° _____
	Date _____
	Pays ou organisation _____ N° _____
	Date _____
	Pays ou organisation _____ N° _____
	Date _____
	<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

<b>5</b> DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)	<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique
Nom ou dénomination sociale	UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III
Prénoms	
Forme juridique	Etablissement à caractère scientifique, culturel
N° SIREN	_____ et professionnel
Code APE-NAF	_____
Domicile ou siège	118 route de Narbonne
	Code postal et ville 31062 TOULOUSE CEDEX 4
	Pays FRANCE
Nationalité	Française
N° de téléphone (facultatif)	N° de télécopie (facultatif)
Adresse électronique (facultatif)	
	<input checked="" type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

Remplir impérativement la 2<sup>ème</sup> page



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

## BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

N° 11354\*03

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Page suite N° .1. / .1.



Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE

LIEU

2 JUIL 2003

31 INPI TOULOUSE

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

0308042

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 829 W / 010702

## Vos références pour ce dossier (facultatif)

**4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ  
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE  
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE  
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE**

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

**5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)**

☒ Personne morale☐ Personne physique

Nom  
ou dénomination sociale

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.)

Prénoms

Forme juridique

Etablissement public doté de la personnalité civile et  
de l'autonomie financière

N° SIREN

Code APE-NAF

Domicile  
ou  
siège

Rue

3 rue Michel-Ange

Code postal et ville

75016 PARIS

Pays

FRANCE

Nationalité

Française

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

**5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)**

☒ Personne morale☐ Personne physique

Nom  
ou dénomination sociale

UNIVERSITE DE MONTREAL

Prénoms

Forme juridique

Personne morale légalement constituée selon le droit

N° SIREN

canadien

Code APE-NAF

Domicile  
ou  
siège

Rue

2900 boulevard Edouard-Montpetit

Code postal et ville

H3T 1J4 MONTREAL, QUEBEC

Pays

CANADA

Nationalité

Canadienne

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

**6 SIGNATURE DU DEMANDEUR  
OU DU MANDATAIRE  
(Nom et qualité du signataire)**

Christian LASSIAILLE - CPI N°

CABINET  
BARRELAPOQUE  
& associés

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER  
92951, rue des amandonniers 31000 TOULOUSE

VISA DE LA PRÉFECTURE  
OU DE L'INPI

P. LUCAS

**BREVET D'INVENTION  
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

**REQUÊTE EN DÉLIVRANCE**  
page 2/2

**BR2**

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES  
DATE

LIEU **2 JUIL 2003**  
**31 INPI TOULOUSE**

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

**0308042**

DB 540 W / 210502

<b>6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)</b>	
Nom	
Prénom	
Cabinet ou Société	Cabinet BARRE LAFORGUE & associés
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel	
Adresse	Rue 95 rue des Amidonniers
	Code postal et ville 31000 TOULOUSE
	Pays FRANCE
N° de téléphone (facultatif)	05 61 21 08 67
N° de télécopie (facultatif)	05 61 22 79 23
Adresse électronique (facultatif)	
<b>7 INVENTEUR (S)</b>	
Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>	
Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>	
Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG	
<b>10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS</b>	
<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint	<input type="checkbox"/>
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe	<input type="checkbox"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé « Suite », indiquez le nombre de pages jointes	
<b>11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)	<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b>
Christian LASSIAILLE - N° CPI 92.113	P. LUCAS

## NOUVEAUX COMPOSES AROMATIQUES INHIBITEURS DES ALDOLASES, PROCEDE DE SYNTHÈSE ET APPLICATIONS

L'invention concerne de nouveaux composés inhibiteurs de  
5 la glycolyse, dont l'action se manifeste par une inhibition des aldolases.  
L'invention concerne aussi leur procédé de synthèse et leurs applications  
-notamment dans la fabrication de médicaments pour le traitement du cancer.

La glycolyse représente un mécanisme complexe qui fait  
intervenir une cascade de dix enzymes différentes pour assurer la dégradation  
10 anaérobie du glucose avec libération d'énergie emmagasinée sous forme d'ATP  
(adénosine-5'-triphosphate).

Parmi les dix enzymes prenant part à la glycolyse, les  
aldolases (fructose-1,6-bisphosphate aldolases), enzymes homotétramériques,  
interviennent dans une étape importante : le clivage du fructose-1,6-bisphosphate  
15 (Fru(1,6) $P_2$ ) en deux trioses phosphates, le dihydroxyacétone phosphate (DHAP)  
et le glycéraldéhyde-3-phosphate (GAP). Le clivage du Fru(1,6) $P_2$  par les  
aldolases s'effectue selon un mécanisme multi-étapes définissant une pluralité  
d'intermédiaires réactionnels bien identifiés.

Les aldolases sont essentielles dans la voie de la glycolyse,  
20 et par conséquent précieuses pour la synthèse du pyruvate et de l'ATP.

Les aldolases se répartissent selon deux classes (Ruther et  
*al.*, 1964, Fed. Proc. Fed. Am. Soc. Exp. Biol., 23:1248-1257). Les aldolases  
d'une classe se distinguent de celles de l'autre classe notamment par leurs  
origines, mais aussi par leur mode de fonctionnement. Les aldolases de classe I,  
25 présentes dans l'espèce animale, les plantes supérieures et certains parasites,  
fixent le Fru(1,6) $P_2$  en formant une imine protonée (ou base de Schiff) entre un  
résidu de lysine (lys-229) du site actif et le substrat. Les aldolases de classe II,  
quant à elles, sont spécifiques des organismes procaryotes. Elles nécessitent la  
présence, au niveau de leur site catalytique, d'un ion métallique bivalent pour  
30 fixer et stabiliser le substrat sous forme énolate, avant clivage.

Parmi les inhibiteurs des aldolases de classe I connus à ce jour, on peut citer des inhibiteurs compétitifs, notamment ceux décrits dans Blonski C. et *al.*, 1997 (Biochem. J., 323:71-77) : des dérivés phosphatés de l'hydroquinone (HQN- $P_2$ ), du résorcinol (RSN- $P_2$ ) et le benzaldéhyde-4-phosphate (HBA- $P$ ). Testés sur l'aldolase de muscle de lapin, ces inhibiteurs présentent, respectivement une constante de dissociation (ou constante d'inhibition)  $K_i$  de l'ordre de 135, 40 et 500  $\mu$ M. On connaît aussi des composés phosphatés de constante d'inhibition  $K_i$  de l'ordre de 30-40  $\mu$ M (Hartman et *al.*, 1965, Biochemistry, 4:1068-1075).

On peut aussi citer le 2-hydroxybenzaldéhyde-4-phosphate (Blonski C. et *al.*, 1997, Biochem. J., 323:71-77) un inhibiteur réversible dépendant du temps de constante d'inhibition globale  $K_i^*$  de  $35 \pm 5$   $\mu$ M, capable de réduire 80 % de l'activité des aldolases pour une concentration d'inhibiteur de l'ordre de 200  $\mu$ M.

A l'instar de ces composés, les autres inhibiteurs des aldolases connus à ce jour (Gefflaut T. et *al.*, 1995, Prog. Biophys. Mol. Biol., 63(3):301-340), et les inhibiteurs de la glycolyse en général, présentent une activité inhibitrice faible, à moins de les utiliser à très forte concentration, ce qui limite considérablement leur champ d'application. Aussi, leur application à faible concentration, par exemple à des concentrations compatibles avec des doses thérapeutiques, est difficilement envisageable.

Or, dans bien des applications, et en particulier dans le domaine médical, une inhibition significative de la glycolyse est recherchée et ce pour des concentrations d'inhibiteur suffisamment faibles pour éviter tout effet nocif pour le patient. A ce titre, on connaît une approche, désignée par approche GRH ("Glycerol rescued hypoxia"), imaginée pour le traitement de certains cancers et de certaines tumeurs solides (Mc Carty M.F., 2001, Med. Hypotheses, 56:286-289). Son fondement repose en particulier sur deux constats.

En premier lieu, il a été montré que les tumeurs solides et les cancers létaux qui se développent dans des tissus où règne une faible concentration en oxygène (conditions d'hypoxie), possèdent un phénotype

faisant intervenir la glycolyse comme voie unique de production d'énergie. Il a été également montré que les cellules de ce type se caractérisent aussi par une absence d'activité de la glycérol kinase, une enzyme particulière qui permet aux cellules saines d'utiliser le glycérol en remplacement du glucose.

5 L'approche GRH propose donc d'inhiber la voie de la glycolyse dans toutes les cellules du patient tout en lui dispensant une dose suffisante de glycérol en guise de source unique d'énergie. Les cellules cancéreuses dont la glycolyse représente la voie primordiale de synthèse d'ATP se trouvent ainsi "affamées" ne pouvant utiliser ni le glucose, ni le glycérol  
10 comme source d'énergie alternative au glucose. Les cellules saines, quant à elles, grâce à l'activité glycérol-kinase et d'autres enzymes de la partie inférieure de la glycolyse (celle des trioses) peuvent utiliser le glycérol pour la synthèse du pyruvate. On affame donc les cellules cancéreuses tout en assurant aux tissus sains un apport énergétique convenable.

15 Cependant, à ce jour, encore aucun traitement anti-cancéreux empruntant l'approche GRH n'a pu être mis en oeuvre en raison de l'absence d'inhibiteurs suffisamment efficaces de la glycolyse, et plus particulièrement d'inhibiteurs d'une des enzymes de la partie supérieure de la glycolyse (celle des hexoses).

20 De même, la glycolyse représentant la seule voie de synthèse énergétique pour de nombreux parasites, le blocage de la glycolyse peut être également une approche très prometteuse pour le traitement de nombreuses pathologies d'origine parasitaire.

Il existe ainsi actuellement une réelle nécessité de pouvoir  
25 disposer d'au moins un inhibiteur efficace de la glycolyse, notamment dans la perspective de surmonter le cancer ainsi que certaines maladies parasitaires, ou dans le cadre d'éradiquer tout organisme pour lequel la glycolyse représente une voie de synthèse d'énergie principale, voire essentielle.

La présente invention vise à pallier les lacunes  
30 précédemment signalées en proposant de nouveaux composés chimiques ayant la capacité d'inhiber la glycolyse et en particulier l'activité des aldolases de classe I.

L'invention vise plus particulièrement à proposer des composés qui par leur efficacité d'inhibition des aldolases peuvent être utilisés à titre de médicaments, c'est-à-dire efficacement et ceci à des doses thérapeutiques -notamment dans le cadre de traitements du cancer-.

5 L'invention a également pour objectif de proposer des applications de ces composés à titre d'agents inhibiteurs de la glycolyse, à l'exception des applications thérapeutiques. Par extension, l'invention tend à proposer de nouveaux médicaments, notamment pour le traitement du cancer et/ou des maladies parasitaires.

10 Enfin, l'invention a pour objectif de proposer un procédé de synthèse des composés selon l'invention, de mise en oeuvre à la fois simple, quantitative et peu coûteuse, en d'autres termes, un procédé compatible avec les contraintes économiques d'une production à l'échelle industrielle.

Dans tout le texte, on adopte la terminologie suivante :

15 - maillon aromatique : cycle conjugué d'un noyau aromatique dans lequel les électrons libres peuvent se déplacer d'un atome de carbone à un autre sans se lier à aucun d'eux (délocalisation des électrons par effet de résonance), et d'un atome de carbone d'un maillon à un atome de carbone d'un autre maillon ; les noyaux aromatiques de type naphthalène mis en oeuvre  
20 dans l'invention présentent ainsi une alternance de liaisons simples (liaisons  $\sigma$ ) et doubles (liaisons  $\pi$ ), conduisant à un système d'électrons  $\pi$  fortement délocalisés entre les deux maillons aromatiques formant ces noyaux,

- mimétique du groupement phosphate : substituant d'un composé chimique, autre qu'un groupement phosphate, adapté pour améliorer la  
25 biodisponibilité du composé chimique au niveau de sa cible protéique (l'aldolase) dans le cadre de l'invention ; les mimétiques du groupement phosphate peuvent être de deux types : des groupements protecteurs enzymolabiles ou des analogues stables du phosphate,

- groupement protecteur enzymolabile : mimétique du  
30 groupement phosphate adapté pour permettre la diffusion passive du composé à travers des systèmes membranaires cellulaires ou parasitaires, selon une méthode




de masquage de charges puis pour subir, à l'intérieur de la cellule ou du parasite, une transformation (ou déprotection) enzymatique de façon à pouvoir générer un groupement phosphate ou un analogue stable du phosphate,

- analogue stable du phosphate : mimétique du groupement phosphate qui par comparaison à un groupement phosphate présente une stabilité améliorée vis-à-vis des conditions physiologiques -notamment pH et/ou environnement enzymatique-.

L'invention concerne un composé aromatique comprenant un groupement aldéhyde, un groupement phénol et un groupement phosphate ou un mimétique du groupement phosphate, tel qu'un groupement protecteur enzymolabile ou un analogue stable du phosphate, caractérisé :

- en ce que son noyau aromatique est formé par la condensation de deux maillons aromatiques de type benzénique,
- et en ce qu'il répond à la formule générale suivante :



dans laquelle :

- le groupement aldéhyde (-CHO) et le groupement phénol (-OH) sont fixés à deux atomes de carbone adjacents d'un même maillon aromatique, dit premier maillon aromatique,
- et, fixé à un atome de carbone d'un deuxième maillon aromatique, dit second maillon aromatique, R est un groupement phosphate ou un mimétique du groupement phosphate.

Bien que les mécanismes réels de l'inhibition des aldolases de classe I ne soient pas définitivement élucidés spécifiquement pour chacun des composés de l'invention, les travaux des inventeurs sur certains de ceux-ci ainsi que les travaux de modélisation du site actif de différentes aldolases de classe I, permettent d'envisager une inhibition efficace de ces aldolases grâce à des composés qui répondent à la définition précédente.

L'invention a ainsi permis de montrer que la présence simultanée d'un groupement phosphate, d'un groupement hydroxyle et d'un groupement aldéhyde, greffés à une structure chimique de géométrie plane telle qu'un noyau aromatique de type naphthalène, est nécessaire pour générer une  
 5 bonne reconnaissance et une affinité appréciable avec le site actif des aldolases.

Le groupement phosphate est essentiel à la reconnaissance de l'inhibiteur par l'aldolase. Le groupement phosphate s'insère à l'intérieur de la poche de reconnaissance de l'enzyme et permet au composé aromatique d'adopter une bonne orientation à l'intérieur du site actif. Le composé  
 10 aromatique expose alors les groupements aldéhyde et phénol à bonne distance d'au moins un des trois résidus de lysine (Lys-107, Lys-146, Lys-229) du site actif, de façon à former avec celui-ci, à pH physiologique, une liaison stable de type imine protonée ou base de Schiff. L'exigence de la disposition du groupement phosphate sur un maillon aromatique autre que celui occupé par  
 15 l'aldéhyde et l'hydroxyle, a ainsi une grande importance. En effet, un noyau aromatique de type naphthalène permet de positionner l'hydroxyle et l'aldéhyde à une distance du groupement phosphate particulièrement appropriée pour une bonne affinité du composé vis-à-vis des aldolases ; la distance séparant le groupement phosphate de l'aldéhyde et de l'hydroxyle conduit à une  
 20 reconnaissance du groupement phosphate par les aldolases et à la stabilisation du composé dans le site actif, par le biais d'un des trois résidus de lysine, avec une très faible contrainte exercée sur le composé et donc une faible dépense d'énergie.

D'autre part, les positions respectives de l'aldéhyde et de  
 25 l'hydroxyle par rapport au phosphate jouent un rôle important dans la sélectivité d'une aldolase particulière pour un composé bien défini selon l'invention.

Enfin, la présence des groupements hydroxyle et aldéhyde sur deux atomes de carbone adjacents d'un même maillon aromatique est primordiale et gouverne la formation de cette liaison particulière au niveau du  
 30 site actif des aldolases de classe I. Le groupement hydroxyle joue vraisemblablement un rôle de catalyseur acide lors de la déshydratation de la

carbinolamine intermédiaire et intervient ensuite vraisemblablement dans la stabilisation de la base de Schiff protonée, générant ainsi une inhibition efficace quasi-irréversible, voire irréversible.

Un noyau aromatique de type naphthalène sur lequel sont greffés les groupements phosphate, aldéhyde et phénol à des positions particulières, permet également et avantageusement de définir un composé à géométrie plane conformationnellement plus contrainte que les substrats des aldolases (Fru(1,6) $P_2$ , GAP, DHAP), et de dimensions adaptées, respectant à la fois les contraintes d'accessibilité du composé au site actif des aldolases, et d'encombrement stérique à ce niveau.

De tels composés aromatiques sont donc susceptibles d'occuper le site actif des aldolases de classe I de sorte que la fixation et le clivage du Fructose-1,6-bisphosphate puissent être empêchés, et *in fine*, de façon à entraîner le blocage de la glycolyse. De tels composés aromatiques sont ainsi susceptibles d'inhiber de façon efficace les aldolases de cellules eucaryotes et/ou de parasites, et donc de bloquer la glycolyse des cellules eucaryotes et/ou parasitaires.

Cependant, lorsqu'une inhibition intracellulaire et/ou intraparasitaire est souhaitée, l'état d'ionisation du groupement phosphate, nécessaire à la reconnaissance et à l'encrage d'un composé selon l'invention au site actif des aldolases, engendre un problème pour le passage de ces inhibiteurs à travers la membrane cellulaire, se traduisant par une mauvaise biodisponibilité de ces composés d'où une faible activité globale.

Une première approche permettant d'améliorer la biodisponibilité d'un composé phosphate, consiste à protéger les groupements phosphates de façon à masquer temporairement ces charges -notamment au moyen de groupements protecteurs enzymolabiles-, et ainsi permettre leur passage de façon passive à travers des membranes cellulaires.

Par ailleurs, le pH, notamment dans les tissus vivants, cellules et parasites, peut être à l'origine d'un clivage spontané du groupement phosphate. De même, de nombreuses enzymes -notamment les phosphatases-

sont capables de cliver la liaison cycle aromatique-phosphate. Aussi, pour les applications sur des tissus, cellules, parasites vivants, il est préférable de substituer ces groupements phosphates par des mimétiques, notamment des analogues stables du phosphate.


5                                   Avantageusement, un mimétique du groupement phosphate est choisi parmi :

- un groupement protecteur enzymolabile adapté pour permettre audit composé aromatique un passage passif à travers des systèmes membranaires cellulaires et/ou parasites et pour pouvoir générer, une fois à l'intérieur
- 10 d'une cellule ou d'un parasite, la formation d'un groupement phosphate ou d'un analogue stable du groupement phosphate,
- un analogue stable du phosphate adapté pour préserver le composé aromatique d'une déphosphorylation spontanée et/ou enzymatique -notamment par les phosphatases cellulaires et/ou parasites-.

15                                   A titre d'exemples non limitatifs de composés selon l'invention susceptibles d'inhiber les aldolases, on peut citer des composés qui, selon la nomenclature officielle, peuvent être désignés par : le 5-formyl-6-hydroxy-2-naphtylphosphate, le 6-formyl-5-hydroxy-2-naphtylphosphate, le 4-formyl-5-hydroxy-1-naphtylphosphate, le 5-formyl-4-hydroxy-1-naphtyl-

20 phosphate, le 4-formyl-3-hydroxy-2-naphtylphosphate, le 3-formyl-4-hydroxy-2-naphtylphosphate, le 3-formyl-2-hydroxy-1-naphtylphosphate, le 2-formyl-3-hydroxy-1-naphtylphosphate, ou un dérivé de ces derniers obtenu par la substitution du groupement phosphate par un mimétique du groupement phosphate selon l'invention.

25                                   Avantageusement, un composé aromatique selon l'invention a pour formule générale :



30 où R<sub>1</sub> est un groupement phosphate ou un mimétique du groupement phosphate.

Lorsque  $R_1$  est un groupement phosphate, le composé aromatique selon la formule générale (II) est alors désigné, conformément à la nomenclature officielle, par le 5-formyl-6-hydroxy-2-naphtylphosphate (désigné par la suite par FHN-*P*). Aussi, un composé selon l'invention et de formule générale  
5 (II) peut être le 5-formyl-6-hydroxy-2-naphtylphosphate ou un dérivé de ce dernier, obtenu par une substitution du groupement phosphate par un mimétique selon l'invention.

Des études d'interaction du FHN-*P* avec les aldolases de classe I, plus particulièrement avec l'aldolase de muscle de lapin, ont été réalisées  
10 par spectroscopie UV/visible de différence et par spectrométrie de masse électrospray. Ces études ont été complétées à la fois par des analyses de cinétiques enzymatiques et des expériences utilisant des aldolases mutées.

Sur l'aldolase de muscle de lapin, l'invention a permis de mettre en évidence la formation d'une base de Schiff entre le groupement  
15 aldéhyde du composé aromatique selon l'invention et l'enzyme. Elles ont également permis de montrer l'implication du résidu Lys-107 dans la formation de cette base de Schiff. Enfin, l'inhibition de l'aldolase de muscle de lapin par le FHN-*P* a été définie comme étant une inhibition réversible dépendante du temps ("slow-binding inhibition"). Ce type d'inhibition, outre le fait de présenter un  
20 haut degré de sélectivité, se caractérise par une fixation lente de l'inhibiteur à l'enzyme qui peut être aussi efficace qu'une inhibition réalisée par un inhibiteur de type irréversible chimiquement réactif (Morrison et Walsch, 1988, Adv. Enzymol. Relat. Areas Mol. Biol., 61:201-301). L'inhibition de l'aldolase de muscle de lapin par le FHN-*P* se caractérise par une constante globale  
25 d'inhibition  $K_i^*$  de l'ordre de 25 nM. Ainsi, ce composé représente à ce jour l'inhibiteur réversible dépendant du temps le plus puissant vis-à-vis des aldolases de classe I. Qui plus est, comme toute inhibition impliquant la formation d'une base de Schiff entre inhibiteur et un résidu de lysine, cette inhibition peut être rendue irréversible par un traitement au borohydrure de sodium du complexe  
30 inhibiteur-enzyme.



Il est à noter qu'un composé tel que le 2-(4-formyl-3-hydroxyphényl)-1-éthylène dihydrogène phosphate peut être considéré dans l'inhibition des aldolases comme un équivalent de FHN-*P*. En effet, ce composé répond, de façon très comparable au FHN-*P*, aux conditions nécessaires à l'inhibition des aldolases, précédemment exposées. La présence du groupement phosphate de ce composé permet tout d'abord une reconnaissance par les aldolases. Ce composé tout comme le FHN-*P* s'oriente alors à l'intérieur du site actif et, compte tenu de la distance séparant le groupement phosphate des groupements aldéhyde et phénol, très sensiblement identique à celle des groupements de FHN-*P*, il expose au proche voisinage d'un des résidus de lysine ses groupements aldéhyde et phénol.

Avantageusement, un groupement protecteur enzymolabile selon l'invention est un groupement de nature à être déprotégé par une(des) estérase(s) intracellulaire(s).

Avantageusement, et selon l'invention ce groupement protecteur enzymolabile présente la formule générale suivante :




où R' peut être choisi parmi un des groupements suivants :







Un composé aromatique selon l'invention présente ainsi un groupement protecteur enzymolabile, dit de type oxyméthylester. Les mécanismes de déprotection d'un tel groupement enzymolabile sont notamment décrits par Farquhar et *al.*, 1983 (J. Pharm. Sci., 72:324-325), et par Srivastva et *al.*, 1984 (Bioorg. Chem., 12:118-124).

Avantageusement, selon une autre variante, un groupement protecteur enzymolabile selon l'invention, de nature à être déprotégé par des estérases intracellulaires, présente la formule générale suivante :




où R'' peut être choisi parmi un des groupements suivants :




20 Bien que les groupements protecteurs enzymolabiles de type thioester font intervenir pour leur déprotection les mêmes enzymes que pour les groupements protecteurs enzymolabiles de type oxyméthylester, le mécanisme réactionnel est cependant bien différent et est notamment décrit par Lefebvre *et al.*, 1995 (J. Med. Chem., 38:3941-3950).

25 Selon une variante de réalisation en matière de masquage temporaire de charge, un groupement protecteur enzymolabile selon l'invention est susceptible d'être déprotégé par une(des) réductase(s) intracellulaire(s).

Avantageusement, selon cette variante de réalisation, un groupement protecteur enzymolabile répond à la formule générale suivante :



où R''' peut être choisi parmi un des groupements suivants :



5 Les mécanismes de déprotection d'un tel groupement protecteur enzymolabile ont été décrits par Puech et *al.*, 1993 (Antiviral Res., 22:155-174).

10 Il est bien entendu possible de pallier l'état ionisé du groupement phosphate de certains composés aromatiques selon l'invention par des techniques autres que le masquage de charges par des groupements protecteurs enzymolabiles. Selon l'application envisagée (sur des aldolases extraites ou non de cellules), on pourra préférer avoir recours à un encapsulage particulier (forme gallénique), ou à une technique d'administration particulière (méthodes d'injections), en complément ou en remplacement des groupements  
15 protecteurs enzymolabiles, et notamment ceux précédemment cités.

Avantageusement, un analogue stable du phosphate selon l'invention peut être choisi parmi l'un des groupements suivants :

- le méthylèneglycolphosphonate,
- le difluorométhylèneglycolphosphonate,
- 20 - le monofluorométhylèneglycolphosphonate,

notamment décrits dans Nieschalk J. et *al.*, 1996 (Tetrahedron Lett., 52(1):165-176).

Avantageusement et selon l'invention, un atome d'hydrogène d'au moins un des atomes de carbone d'au moins un des maillons  
25 aromatiques est substitué par un substituant, dit substituant hydrophobe adapté pour améliorer l'hydrophobicité globale du composé. La présence d'un tel groupement facilite l'accès d'un composé aromatique selon l'invention au site actif, relativement hydrophobe, des aldolases. Il convient en outre de choisir un groupement compatible avec la synthèse du composé selon l'invention et de tenir  
30 compte des contraintes d'encombrement stérique au niveau du site actif des aldolases.



Avantageusement, chacun des substituants hydrophobes selon l'invention est un groupement alkyle de chaîne principale comprenant au maximum trois atomes de carbone.

5 L'invention concerne en outre un composé aromatique selon l'invention pour ses utilisations comme agent inhibiteur de l'activité des aldolases de classe I, et par extrapolation, comme agent inhibiteur de la glycolyse, chez les organismes eucaryotes. Avantageusement, l'utilisation d'un composé aromatique se fait dans un cadre non thérapeutique.

10 Avantageusement et selon l'invention, un composé aromatique utilisé à cette fin est susceptible de présenter une constante d'inhibition  $K_i$  des aldolases inférieure à 25  $\mu\text{M}$ , notamment inférieure à 50 nM -typiquement de l'ordre de 25 nM-.

15 Avantageusement et selon l'invention, un composé aromatique utilisé à cette fin est susceptible d'inhiber au moins une aldolase de façon irréversible ou quasi irréversible.

L'invention s'étend à un procédé d'inhibition d'aldolases extracellulaires ou intracellulaires, avantageusement à l'exception des aldolases intracellulaires de cellules vivantes non isolées d'un corps humain ou d'un corps animal ou d'un embryon humain, dans lequel on met ces aldolases au contact d'au  
20 moins un composé aromatique selon l'invention, au moins en quantité suffisante pour induire un effet notable sur l'activité des aldolases.

Avantageusement, un procédé selon l'invention est appliqué à l'inhibition de la glycolyse cellulaire.

25 Avantageusement, un procédé selon l'invention peut être appliqué pour enrayer le développement d'une cellule cancéreuse.

L'invention s'étend aussi à un médicament comprenant un composé aromatique selon l'invention.

30 Dans la lutte contre le cancer, différentes approches thérapeutiques ont été imaginées (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie,...) et de nombreux traitements sont aujourd'hui utilisés. Toutefois, à ce jour, il n'existe aucun traitement totalement efficace contre les cancers. Le choix des traitements

actuels se fait généralement en fonction du type de tissu et des organes atteints, ainsi que du degré de diffusion et de la malignité. Cependant, beaucoup de traitements sont mal supportés à plus ou moins long terme par les patients. De ce fait, une approche multi-thérapeutique est généralement prescrite, d'où la  
5 nécessité de pouvoir disposer de différents traitements pour pouvoir soigner un même type de cancer et qu'il sera possible de prescrire alternativement à un patient. La possibilité de pouvoir mettre en oeuvre l'approche GRH donnerait lieu à de nouveaux traitements et ainsi un grand progrès dans la lutte contre le cancer. Un composé aromatique selon l'invention permet de mettre en œuvre très  
10 favorablement l'approche GRH.

L'invention s'étend ainsi également à l'utilisation d'un composé aromatique selon l'invention pour la fabrication d'un médicament pour le traitement du cancer -notamment pour la fabrication d'un médicament pour le traitement du cancer s'effectuant selon l'approche GRH-.

15 L'invention s'étend aussi à un procédé de synthèse d'un composé aromatique selon l'invention.

Selon un premier aspect de l'invention, le procédé permet la synthèse d'un 1-hydroxy-2-naphtaldéhyde phosphorylé sur un atome de carbone du deuxième maillon aromatique.

20 Avantageusement, un procédé de synthèse selon l'invention comprend une étape de phosphorylation d'un composé 2-naphtaldéhyde dihydroxylé, hydroxylé sur l'atome de carbone 1 du premier maillon aromatique et sur un des atomes de carbone du second maillon aromatique, ladite phosphorylation correspondant à une substitution du groupement hydroxyle du  
25 second maillon aromatique par un groupement phosphate.

Avantageusement et selon l'invention, l'étape de phosphorylation est initiée par la technique du triéthyl phosphite, pyridine et iode, dans une solution de  $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{THF}$  (Stowel J.K. et *al.*, 1995, Tetrahedron Lett., 36:182-185 ; Ladame S. et *al.*, 2001, Phosphorus, Sulfur and Silicon,  
30 174:37-47).

Avantageusement et selon l'invention, la phosphorylation est effectuée sur le 1,6-dihydroxy-2-naphtaldéhyde pour aboutir, après déprotection (Page P. et *al.*, 1999, Bioor. Med. Chem., 7:1403-1412), au 5-formyl-6-hydroxy-2-naphtylphosphate (FHN-P).

5 L'invention concerne aussi un composé aromatique inhibiteur d'aldolase, un procédé d'inhibition des aldolases et de la glycolyse, ainsi qu'un médicament, caractérisés en combinaison par tout ou partie des caractéristiques mentionnées ci-dessus ou ci-après.

D'autres buts, caractéristiques et avantages de l'invention  
10 apparaissent à la lecture des exemples qui suivent. Les figures 1 à 5 illustrent les résultats obtenus dans ces exemples.

#### Méthodes de synthèse et d'analyse physico-chimique

Toutes les réactions sensibles à l'humidité ont été réalisées sous atmosphère d'argon dans des conditions anhydres.

15 Le tétrahydrofurane (THF) et l'éther éthylique sont distillés sur sodium/benzophénone. Le dichlorométhane est distillé sur P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. La pyridine et la triéthylamine sont distillées sur de la potasse. Le méthanol est distillé en présence d'une quantité faible de sodium. Les solvants pour les chromatographies liquides à haute pression (HPLC) sont utilisés sans autres purifications.

20 L'évolution des réactions a été suivie par chromatographie sur couche mince (CCM) sur plaque de silice (Merck 60-F254) en utilisant des systèmes d'éluant appropriés. Les produits ont été révélés par irradiation UV ( $\lambda=254$  nm et 366 nm) ou par utilisation de vapeur d'iode ou de révélateur spécifique comme le zinzade (molybdate d'ammonium) pour les produits  
25 phosphorylés, ou le révélateur de Pancaldi contenant 5% de sulfate de cérium (IV), une solution aqueuse d'acide sulfurique à 6% et 8% de molybdate d'ammonium.

Les produits ont été purifiés par chromatographie flash sur gel de silice (Merck-60, 230-400 mesh) ou bien par chromatographie liquide à  
30 haute pression (HPLC) préparative sur colonne phase inverse C18 (Macherey-Nagel polygoprep C18, 12-25  $\mu$ m, 60A) avec des systèmes d'éluant appropriés.

Les spectres RMN  $^1\text{H}$ ,  $^{13}\text{C}$  et  $^{31}\text{P}$  ont été enregistrés sur des spectromètres Bruker AC 200 ou AC 250. Les déplacements chimiques ( $\delta$ ) sont exprimés en ppm, à partir du tétraméthylsilane pour les noyaux  $^1\text{H}$  et  $^{13}\text{C}$ , à partir de l'acide phosphorique pour le noyau  $^{31}\text{P}$ . Les valeurs des constantes de couplages sont exprimées en Hz. Les abréviations suivantes ont été utilisées : s, singulet ; se singulet élargi ; d, doublet ; t, triplet ; q, quadruplet et m, multiplet.

Les spectres de masse (DCI) sont réalisés sur un spectromètre quadripolaire Nermag R10-10.

Les analyses élémentaires ont été effectuées sur un appareil Eager 200.

EXEMPLE 1 : Synthèse du 5-formyl-6-hydroxy-2-naphtylphosphate (FHN-P) :

Le 1,6-dihydroxy-2-naphtaldéhyde (0,21 g ; 1,1 mmol), préalablement synthétisé (Jonhson W.S.J. et Shelberg W.E., 1945, J. Am. Chem. Soc., 67:1745-1753 ; Jonhson W.S.J. et *al.*, 1944, J. Am. Chem. Soc., 66:218-222 ; Bilger C. et *al.*, 1987, Eur. J. Med. Chem., 22:363-365), est mis en solution dans du  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (34 ml). On ajoute de la pyridine anhydre (0,1 ml ; 1,24 mmol) maintenue à  $0^\circ\text{C}$ . On ajoute alors un mélange de iode (0,1 g ; 1,2 mmol) et de triéthyle phosphite (0,23 ml ; 1,32 mmol) dissous dans du  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (10 ml). L'ensemble est maintenu sous agitation à  $0^\circ\text{C}$  pendant 1 heure puis laissé à température ambiante. De l'eau (20 ml) est ajoutée. La phase organique est lavée avec de la saumure (solution d'eau saturée en NaCl) puis séchée sur du  $\text{MgSO}_4$ . On supprime le solvant à pression réduite. Après chromatographie flash ( $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ ), une huile de couleur jaune est obtenue (0,11 g ; 31%) : le 1-hydroxy-2-naphtaldéhyde-6-diéthylphosphate.

Du bromotriméthylsilane (0,15 ml ; 1,1 mmol) est ajouté lentement sous agitation à la solution de 1-hydroxy-2-naphtaldéhyde-6-diéthylphosphate (0,054 g ; 0,17 mmol) précédemment obtenue, en solution dans du  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  anhydre (200  $\mu\text{l}$ ) sous atmosphère d'azote. Le mélange obtenu est agité pendant 3 heures à température ambiante. Du  $\text{Et}_2\text{O}/\text{H}_2\text{O}$  (10:1) est alors ajouté et la phase organique obtenue est lavée à l'eau. Le pH de la phase aqueuse

est ajusté à 7,6 avec de la soude 1 M. La solution est lyophilisée pour aboutir à une poudre blanche (0,050 g ; 96%) de 5-formyl-6-hydroxy-2-naphtylphosphate (FHN-*P*) sous forme de sel de sodium.

<sup>1</sup>H NMR (250 MHz, D<sub>2</sub>O) : δ7,11 (d, <sup>3</sup>J<sub>H3-H4</sub>=8,50 Hz, 1H, H3) ; 7,34 (d, <sup>3</sup>J<sub>H7-H8</sub>=8,00 Hz, 1H, H7) ; 7,41 (se, 1H, H5) ; 8,24 (d, <sup>3</sup>J<sub>H4-H3</sub>=8,50 Hz, 1H, H4) ; 9,84 (d, <sup>3</sup>J<sub>H8-H7</sub>=8,00 Hz, 1H, H8) ; 9,91 (s, 1H, CHO).

<sup>13</sup>C NMR (50 MHz, D<sub>2</sub>O) : δ114,73 (C2) ; 116,93 (C10) ; 118,32 (d, <sup>3</sup>J<sub>C-P</sub>=3,57 Hz, C5) ; 120,13 (C8) ; 123,36 (d, <sup>3</sup>J<sub>C-P</sub>=5,00 Hz, C7) ; 123,42 (C9) ; 126,72 (C3) ; 128,31 (C4) ; 142,35 (C1) ; 158,49 (d, <sup>2</sup>J<sub>C-P</sub>=6,00 Hz, C6) ; 198,32 (CHO).

<sup>31</sup>P NMR (81 MHz, D<sub>2</sub>O) : δ0,56.

Spectrométrie de masse (FAB) : 267, λ<sub>max</sub><sup>H<sub>2</sub>O</sup> (pH 7,6) : 392 nm (ε5100 M<sup>-1</sup>·cm<sup>-1</sup>), 277 nm (ε4650 M<sup>-1</sup>·cm<sup>-1</sup>).

#### EXEMPLE 2 : Activité inhibitrice de l'aldolase de muscle de lapin (RM) par FHN-*P*

##### 15 • Méthode d'analyse :

L'activité aldolase a été mesurée au moyen d'un système de tests enzymatiques couplés : le système triose-phosphate isomérase et glycérol-3-phosphate déshydrogénase (TIM/GDH) en suivant l'oxydation du NADH (Boehringer-Mannheim, France), à 340 nm, au moyen d'un spectrophotomètre SAFAS thermostaté à 25°C. Les tests ont été initiés par addition du substrat (le Fru (1,6)*P*<sub>2</sub> ; 1 mM en concentration finale), pour compléter une solution d'aldolase réalisée dans un tampon triéthanolamine (tampon TEA) (100 mM TEA/HCl ; 50 mM NaCl ; 1 mM EDTA, pH 7,6 ; de force ionique 0,15), 0,42 mM de NADH, et contenant les deux systèmes enzymatiques (10 µg/ml de GDH et 1 µg/ml de TIM) pour un volume final de 1 ml. La construction, la surexpression et la purification de l'aldolase recombinante ont été réalisées selon Morris A.J. et *al.*, 1993, (J. Biol. Chem., 265:1095-1100) et Berthiaume L. et *al.*, 1993 (J. Biol. Chem., 268:10826-10835).

Le taux de clivage du substrat est déterminé en mesurant la décroissance de l'absorbance/minute à 340 nm. L'aldolase est dialysée toute la nuit à 4°C contre un tampon TEA avant utilisation. La concentration en protéine

est déterminée par spectrophotométrie en utilisant comme coefficient d'extinction  $\epsilon_{280}=0,91 \text{ ml.mg}^{-1}.\text{cm}^{-1}$ . La concentration de sous-unités est déterminée en se basant sur un poids moléculaire de 159 000 pour un tétramère d'aldolase.

- Méthode cinétique :

5 Dans le cas présent, l'inhibition réversible dépendante du temps ("Slow binding inhibition") implique la formation rapide d'un équilibre entre l'enzyme E et l'inhibiteur I, suivie d'un complexe initial EI qui subit une isomérisation lente et réversible vers un complexe EI\* cinétiquement plus stable, comme montré dans le schéma réactionnel et dans les équations réactionnelles  
10 présentés à la Figure 1, où  $K_i^*$  représente la constante globale d'inhibition,  $K_i$  la constante de dissociation du complexe de Michaelis EI, rapidement formé, et  $K_d$  la constante de dissociation du complexe EI\*.

- Caractérisation de l'inhibition réversible dépendante du temps :

En absence du substrat la constante de vitesse apparente  
15 d'ordre 1 ( $k_{app}$ ) décrivant la formation du complexe EI\* est définie par l'équation eqn.(1) (Figure 1) (Morrison et Walsh, 1988, Adv. Enzymol. Relat. Areas Mol. Biol, 61:201-300).

La valeur de  $k_{app}$  reflète la cinétique de saturation lorsque  
la concentration d'inhibiteur [I] croît, elle varie entre des limites basse et haute,  
20 respectivement, de  $k_{-2}$  et  $k_2+k_{-2}$ .

A l'équilibre, lorsque  $[EI^*]>[EI]$ , on utilise l'équation  
eqn.(2) (Figure 1), où  $[E]_i$  et  $[I]_i$  représentent les concentrations initiales, respectivement, de l'enzyme et de l'inhibiteur ; et  $K_d$  est la constante de dissociation du complexe EI\* (Segal I.H., 1975, Enzyme kinetics : Behavior and  
25 Analysis of Steady-State and Rapid Equilibrium Enzyme Systems, Willey-Interscience, New-York).

Dans la situation extrême où  $k_{-2}$  tend vers zéro, un inhibiteur réversible dépendant du temps peut s'apparenter à un inhibiteur irréversible dirigé contre le site actif. Dans cette situation, l'équation eqn.(3) est  
30 utilisée pour ce type d'inhibition (Meloche H.P., 1967, Biochemistry, 6:2273-2280). Le temps de demi-inactivation de l'enzyme ( $t_{1/2}$ ) se définit comme étant

une fonction de la concentration de l'inhibiteur réciproque et est représentée graphiquement par une droite coupant l'axe des ordonnées en  $\ln(2/k_2)$  et coupant l'axe des abscisses en  $-1/K_i$ .

◦ Protocole expérimental :

5 L'aldolase native (5  $\mu\text{M}$  de sous-unités) est incubée en présence de FHN-*P* (0,05-1 mM) dans le tampon TEA. L'activité enzymatique est analysée en fonction du temps avec des aliquots de 10  $\mu\text{l}$ .

La cinétique d'inactivation suit une cinétique de pseudo premier ordre et les paramètres cinétiques  $K_i$  et  $k_2$  sont déterminés en utilisant  
10 l'équation eqn.(3). Pour déterminer le taux de réactivation, l'aldolase (25  $\mu\text{M}$  de sous-unités dans le tampon TEA) est incubée avec 500  $\mu\text{M}$  de FHN-*P* jusqu'à obtenir 90% d'inactivation. L'excès d'inhibiteur est enlevé par ultrafiltration en utilisant une membrane (Millipore) PM-30. Le complexe enzyme-inhibiteur est incubé dans le tampon TEA (15  $\mu\text{M}$  de sous-unités en concentration finale)  
15 contenant l'hexitol-*P*<sub>2</sub> (10 mM). Des aliquots (10  $\mu\text{l}$ ) sont prélevés à différents temps pour mesurer l'activité aldolase.

Les contrôles consistent à répéter le protocole sans FHN-*P*. Le processus de réactivation est analysé comme si c'était une réaction d'ordre 1.

- Suivi par spectroscopie UV/visible de différence.

20 Les spectres d'absorption sont mesurés en utilisant un spectrophotomètre Cary 1E Varian thermostaté à 25°C. Le même tampon TEA est utilisé pour les titrations et les analyses d'activité. Les spectres d'absorption sont mesurés par deux méthodes différentes, notamment décrites dans Gefflaut T. et *al.*, 1986 (Bioorg. Med. Chem., 4:2043-2054) et Blonski C. et *al.*, 1997  
25 (Biochem. J., 323:71-77).

Pour la méthode A, les spectres d'absorption sont enregistrés en fonction temps, soit entre 250 et 500 nm, soit à des longueurs d'onde correspondant à l'absorption maximale ou minimale. Les mesures sont initiées par addition de FHN-*P* à différentes concentrations finales (0,1-1 mM)  
30 dans le tampon TEA renfermant une concentration fixe d'aldolase (10  $\mu\text{M}$  de sous-unités). Les spectres d'absorption mesurés du complexe enzymatique sont

corrigés avec l'absorbance du tampon, de FHN-*P*, et de l'enzyme (mesurées séparément). Les spectres d'absorption de différence ainsi obtenus sont utilisés pour déterminer la valeur des constantes définissant la formation du complexe aldolase-inhibiteur.

5 La méthode B est utilisée pour le titration du FHN-*P* par l'acide aminocaproïque. Pour chaque analyse au tampon TEA renfermant une concentration fixe de FHN-*P* (10  $\mu$ M), l'acide aminocaproïque est ajouté pour obtenir différentes concentrations finales (0,01-0,2 M). Les spectres d'absorption de différence, correspondant à la formation d'une base de Schiff, sont enregistrés  
10 à différents intervalles de temps, puis corrigés avec l'absorbance du tampon, de l'acide aminocaproïque, et de FHN-*P* (mesurées séparément).

La constante de vitesse apparente d'ordre 1 ( $k_{app}$ ) et les variations d'absorption maximales limites ( $\Delta A_{max}$ ) sont obtenues pour chaque test en appliquant les données d'absorption dépendantes du temps à l'équation  
15 cinétique d'ordre 1 (ou à l'ensemble des deux mécanismes cinétiques d'ordre 1). La constante de dissociation ( $K_d$ ) de la base de Schiff formée entre le FHN-*P* et l'acide aminocaproïque est obtenue à partir des différences d'absorption déterminées à l'équilibre en utilisant l'équation eqn.(2). La valeur de la constante de dissociation ( $K_i$ ) du complexe EI rapidement formé et celle de la constante  $k_2$   
20 correspondant à la formation lente du complexe EI\* proviennent de l'analyse des valeurs des constantes d'ordre 1 selon les équations eqn.(1) ou eqn.(3).

Tous les tests de spectroscopie UV/visible de différence utilisant des aldolases mutants (10  $\mu$ M de sous-unités) sont menés en utilisant la méthode A.

25 - Suivi par spectrométrie de masse électrospray (ESI/MS)

Les spectres de masse électrospray sont obtenus en mode positif sur un quadripôle Finnigan Mat TSQ 700. Les aldolases (50  $\mu$ M de sous-unités dans le tampon TEA) sont incubées avec 50  $\mu$ M de FHN-*P* jusqu'à atteindre  $60 \pm 5$  % d'inactivation. L'excès d'inhibiteur est supprimé par  
30 ultrafiltration au tampon acétate d'ammonium (10 mM, pH 5,5). Les échantillons sont préparés à environ 10 pmol/ $\mu$ l dans H<sub>2</sub>O/méthanol (1:1, v/v) avec une



- 5

10

15

20

25

Tableau 1

Conditions	Activité spécifique (Unité/mg)
RM seul	12,5±0,5
RM + FHN- <i>P</i>	2,8±0,3
RM + FHN- <i>P</i> + Fru(1,6) <i>P</i> <sub>2</sub>	5,2±0,4
RM + FHN- <i>P</i> + hexitol- <i>P</i> <sub>2</sub>	9,9±0,5
RM + DHNA	12,5±0,5

Tableau 2

Paramètres	Valeur
$K_i(\mu\text{M})$	250±100
$k_2(\text{min}^{-1})$	0,07±0,01
$k_{-2}(\text{min}^{-1})$	13±7.10 <sup>-6</sup>
$K_i^*(\text{nM})$	40±20

5

L'activité enzymatique est récupérée pour partie en incubant les enzymes inactivées dans une solution dépourvue de FHN-*P* et contenant une concentration saturante en hexitol-*P*<sub>2</sub> (10 mM). La valeur de la constante d'ordre 1 ( $k_{-2}=1,3\pm 7,10^{-5}\text{min}^{-1}$ ) reflétant le recouvrement de l'activité enzymatique est d'environ quatre ordres inférieurs à la constante d'inactivation  $k_2$ .

10

FHN-*P* se comporte donc comme un inhibiteur réversible dépendant du temps. D'après les valeurs exposées dans le Tableau 2, la constante globale de dissociation  $K_i^*$  peut être estimée à 40±20 nM. Par ailleurs, l'activité enzymatique ne peut être restaurée après un traitement du complexe enzyme-inhibiteur par le borohydrure de sodium, ce qui suggère que le mécanisme d'inhibition par FHN-*P* engendre la formation d'une base de Schiff avec un résidu de lysine du site actif.

15

- Interaction du FHN-*P* avec l'acide aminocaproïque

Le FHN-*P* et le groupe ε-amino des résidus de lysine de l'aldolase ont été pris comme modèle pour la formation de la base de Schiff ; la

20

réaction de FHN-*P* (10 μM) avec l'acide aminocaproïque (0,1-1 mM) comme référence, et a été suivie par spectroscopie UV/visible de différence. La réaction modèle, représentée à la Figure 3 (partie supérieure), se caractérise par des changements d'absorbance en UV/visible de différence correspondant à deux maxima à 425 nm ( $\Delta\epsilon$  3730  $\pm$  200 M<sup>-1</sup>.cm<sup>-1</sup>) et à 291 nm ( $\Delta\epsilon$  13080  $\pm$  700 M<sup>-1</sup>.cm<sup>-1</sup>), ce qui peut être attribué à la formation d'une base de Schiff. Cette réaction modèle se caractérise également par deux minima à 367 nm ( $\Delta\epsilon$  740  $\pm$  50 M<sup>-1</sup>.cm<sup>-1</sup>) et à 267 nm ( $\Delta\epsilon$  5650  $\pm$  300 M<sup>-1</sup>.cm<sup>-1</sup>) résultant de la perte de FHN-*P* à l'intérieur du complexe covalent. La présence des points isosbestiques à 388, 343 et 276 nm indique que les intermédiaires ne s'accumulent pas et qu'il n'y a pas non plus de réaction secondaire. Les changements d'absorbance différentielle à l'équilibre deviennent saturants lorsqu'on augmente les concentrations en acide aminocaproïque (Figure 2) et la cinétique de réaction pour chacune de ces concentrations s'apparente à celle d'un mécanisme réactionnel de pseudo premier ordre et correspond à une constante d'ordre 2,  $k_{2nd}$  de 0,12  $\pm$  0,01 M<sup>-1</sup>.min<sup>-1</sup> à 25°C. La valeur de la constante de dissociation,  $K_d$ , du complexe FHN-*P*-acide aminocaproïque est de 16  $\pm$  3 mM (Figure 2).

- Interaction entre FHN-*P* et l'aldolase de muscle de lapin

Lorsque le FHN-*P* (0,1-1 mM, de concentration finale) est ajouté à une solution contenant l'aldolase native (10 μM de sous-unités), le spectre UV/visible de différence résultant présente des maxima à 431 et 293 nm, des minima à 376 et 268 nm, et des points isosbestiques à 401 et 279 nm (Figure 3, partie inférieure). Les légères différences dans les positions de bandes avec la réaction modèle peuvent être attribuées à des différences d'environnement protéique de FHN-*P* par rapport au système modèle. L'évolution des spectres de différences d'absorbance coïncide avec deux mécanismes d'ordre 1 distincts. La phase de cinétique rapide se manifeste par un changement d'absorbance plus important et un comportement saturant à concentration élevée d'inhibiteur, corrélée à une perte totale d'activité de l'enzyme. Une phase de cinétique lente est également observée lorsque les analyses sont menées à des concentrations saturantes d'hexitol-*P*<sub>2</sub> (10 mM). Cette phase de cinétique lente, qui correspond à

une constante trente fois plus faible et qui contribue à un quart de la variation finale d'absorbance n'est pas liée à l'inhibition observée. A ces concentrations saturantes, les coefficients d'absorption molaire relatifs au FHN-*P* lié sont calculés en supposant que les quatre sites actifs des aldolases sont occupés :

5  $\Delta\epsilon_{431} = 3600 \pm 200 \text{ M}^{-1}.\text{cm}^{-1}$  ;  $\Delta\epsilon_{376} = -2140 \pm 110 \text{ M}^{-1}.\text{cm}^{-1}$  ;  $\Delta\epsilon_{293} = 12480 \pm 650 \text{ M}^{-1}.\text{cm}^{-1}$  et  $\Delta\epsilon_{268} = 5080 \pm 250 \text{ M}^{-1}.\text{cm}^{-1}$ .

La stoechiométrie de la liaison de FHN-*P* à l'aldolase pour une inhibition maximale est cohérente avec les absorbances moléculaires différentielles provenant du complexe acide aminocaproïque-FHN-*P*, qui prédit

10 au complexe EI\* ayant 3,9-4,2 moles de FHN-*P* liés par mole d'aldolase tétramérique.

Les paramètres cinétiques,  $K_i$  et  $k_2$  caractérisant la formation du complexe EI\* sont déterminés à partir des données exposées à la Figure 4 selon les équations eqn.(1) ou eqn.(3) et conduisant aux valeurs de

15  $K_i = 125 \pm 25 \text{ } \mu\text{M}$ ,  $k_2 = 0,067 \pm 0,004 \text{ min}^{-1}$  et  $t_{1/2} \sim 6 \text{ min}$ .

La constante globale d'inhibition  $K_i^*$  calculée à partir de ces derniers résultats correspond à  $25 \pm 15 \text{ nM}$ .

- Analyse du complexe aldolase-FHN-*P* par spectrométrie de masse électrospray.

20 L'analyse en spectrométrie de masse électrospray d'un complexe aldolase-FHN-*P* a conduit à des masses moléculaires correspondant à : un monomère d'aldolase (39212 Da) ; un complexe binaire entre une sous-unité d'aldolase et le FHN-*P* (39460 Da), sous forme de base de Schiff, et des traces de complexe tertiaire entre une sous-unité d'aldolase et 2 molécules de FHN-*P*

25 (39712 Da) (Figure 5).

- Interaction entre les mutants de l'aldolase RM et FHN-*P*

Les résidus de lysine 107, 146 et 229 sont localisés au niveau des sites actifs de l'aldolase et sont ainsi des candidats pour réaliser l'inactivation via la formation d'une base de Schiff avec le FHN-*P*. Pour identifier

30 quelle lysine est responsable des absorbances différentielles en présence de FHN-*P*, des mutations ponctuelles de ces résidus de lysine ont été réalisées et

nommées : K107M (Research Collaboratory for Structural Bioinformatics Protein Databank), K146M (Blonski C. et *al.*, 1997, Biochem. J. 323:71-77) et K229M (Research Collaboratory for Structural Bioinformatics Protein Databank). La comparaison des coordonnées atomiques de K107M, K229M, et de l'enzyme native, montre que ces mutants de structure sont isomorphes par rapport à l'enzyme sauvage (les déviations standard ("rms déviations") des coordonnées atomiques par rapport à l'aldolase natif est de 0,41 Å et 0,48 Å respectivement pour les structures K107M et K229M). La spectroscopie UV/visible de différence (méthode A) a été utilisée pour examiner la formation du complexe enzymatique pour chaque mutation ponctuelle en présence d'une concentration fixe de FHN-*P* (300 µM). L'analyse des données obtenues à 431 nm est reportée au Tableau 3.

Tableau 3

Aldolase	Activité spécifique (unités/mg)	Activité spécifique résiduelle (%)	$k_{app}$ (min <sup>-1</sup> )	ΔA relative à 431 nm (%)
Sauvage	12,5	nd (non détecté)	0,045±0,0025 0,0015±0,0003	100 25
K229M	3.10 <sup>-6</sup>	nd	0,040±0,0025 0,0015±0,0003	95 25
K107M	0,7	95	0,0015±0,0005	30
K146M	2.10 <sup>-3</sup>	nd	0,005±0,0005 0,0015±0,0003	98 25

Les spectres de différence observés pour le mutant K229M sont identiques à ceux observés avec l'aldolase sauvage. L'évolution de la réaction peut être justifiée par deux mécanismes d'ordre 1 distincts. Les paramètres cinétiques et le niveau de complexe EI\* formé sont identiques à ceux obtenus avec l'enzyme sauvage, et excluent la Lys-229 comme résidu de lysine directement responsable de la formation de la base de Schiff.

Par comparaison, les spectres de différences du mutant K107M et de FHN-*P* montrent une phase de cinétique lente dont la constante et

l'absorbance maximale sont identiques aux valeurs de la phase lente observée pour l'enzyme sauvage. L'absence de phase rapide ajoutée à l'absence d'inhibition de l'enzyme prouve l'implication de la Lys-107 dans le phénomène d'inhibition réversible dépendante du temps.

5                                    La réaction du mutant K146M avec FHN-*P* a pour résultat un changement global d'absorbance à l'équilibre, comparable avec ce qui est observé pour l'aldolase sauvage (Tableau 3). La phase de la cinétique associée à l'inhibition enzymatique, bien que correspondant à un mécanisme d'ordre 1, diffère de ce qui est observé dans le cas de l'aldolase sauvage par une formation  
10 très lente de la base de Schiff. La substitution de la Lys-147 par une méthionine engendre donc une baisse significative du taux de complexes EI\* formés, mais ne change pas la capacité du mutant à former le complexe. Ainsi, la Lys-146 n'est pas requise pour la formation de la base de Schiff mais facilite considérablement celle-ci.


15

## REVENDEICATIONS

1/ - Composé aromatique comprenant un groupement aldéhyde, un groupement phénol et un groupement phosphate ou un mimétique, caractérisé :

5 - en ce que son noyau aromatique comprend deux maillons aromatiques de type benzénique,

- et en ce qu'il répond à la formule générale suivante :




dans laquelle :

- le groupement aldéhyde (-CHO) et le groupement phénol (-OH) sont fixés à deux atomes de carbone adjacents d'un même maillon aromatique, dit premier maillon aromatique,
- 15 • et fixé à un atome de carbone d'un deuxième maillon aromatique dit second maillon aromatique, R est un groupement phosphate ou un mimétique du groupement phosphate choisi parmi :

- un groupement protecteur enzymolabile adapté pour permettre audit composé aromatique un passage passif à travers des systèmes membranaires cellulaires et/ou parasitaires et pour pouvoir générer, une fois à l'intérieur d'une cellule ou d'un parasite, la formation d'un groupement phosphate ou d'un analogue stable du groupement phosphate,
- 20 - un analogue stable du groupement phosphate adapté pour préserver le composé aromatique d'une déphosphorylation spontanée et/ou enzymatique.

25

2/ - Composé aromatique selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il a pour formule générale :




## REVENDICATIONS

1/ - Composé aromatique comprenant un groupement aldéhyde, un groupement phénol et un groupement phosphate ou un mimétique, caractérisé :

5 - en ce que son noyau aromatique comprend deux maillons aromatiques de type benzénique,

- et en ce qu'il répond à la formule générale suivante :



10

dans laquelle :


- le groupement aldéhyde (-CHO) et le groupement phénol (-OH) sont fixés à deux atomes de carbone adjacents d'un même maillon aromatique, dit premier maillon aromatique,
- 15 • et fixé à un atome de carbone d'un deuxième maillon aromatique dit second maillon aromatique, R est un groupement phosphate ou un mimétique du groupement phosphate choisi parmi :

20

- un groupement protecteur enzymolabile adapté pour permettre audit composé aromatique un passage passif à travers des systèmes membranaires cellulaires et/ou parasitaires et pour pouvoir générer, une fois à l'intérieur d'une cellule ou d'un parasite, la formation d'un groupement phosphate ou d'un analogue stable du groupement phosphate,
- un analogue stable du groupement phosphate adapté pour
- 25 préserver le composé aromatique d'une déphosphorylation spontanée et/ou enzymatique.

2/ - Composé aromatique selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il a pour formule générale :

30







où R<sub>1</sub> est un groupement phosphate ou un mimétique du groupement phosphate.

3/ - Composé aromatique selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le groupement protecteur enzymolabile est un groupement de nature à être déprotégé par une(des) estérase(s) et intracellulaires.


5 4/ - Composé aromatique selon la revendication 3, caractérisé en ce que le groupement protecteur enzymolabile présente la formule générale suivante :






où R' est choisi parmi un des groupements suivants :



20 5/ - Composé aromatique selon la revendication 3, caractérisé en ce que le groupement protecteur enzymolabile présente la formule générale suivante :




25 où R'' est choisi parmi un des groupements suivants :





où  $R_1$  est un groupement phosphate ou un mimétique du groupement phosphate.

3/ - Composé aromatique selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le groupement protecteur enzymolabile est un groupement de nature à être déprotégé par une(des) estérase(s) et intracellulaires.


5 4/ - Composé aromatique selon la revendication 3, caractérisé en ce que le groupement protecteur enzymolabile présente la formule générale suivante :






où  $R'$  est choisi parmi un des groupements suivants :




20 5/ - Composé aromatique selon la revendication 3, caractérisé en ce que le groupement protecteur enzymolabile présente la formule générale suivante :




25 où  $R''$  est choisi parmi un des groupements suivants :






6/ - Composé aromatique selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le groupement protecteur enzymolabile est un groupement de nature à être déprotégé par une(des) réductase(s) intracellulaire(s).

7/ - Composé aromatique selon la revendication 6, caractérisé en ce que le groupement protecteur enzymolabile présente la formule générale suivante :



où R''' est choisi parmi un des groupements suivants :




8/ - Composé aromatique selon la revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'analogue stable du phosphate est choisi parmi l'un des groupements suivants :

- le méthylènegphosphonate,
- le difluorométhylènegphosphonate,
- le monofluorométhylènegphosphonate.


9/ - Composé aromatique selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'un atome d'hydrogène d'au moins un des atomes de carbone d'au moins un des maillons aromatiques est substitué par un substituant, dit substituant hydrophobe, adapté pour améliorer l'hydrophobicité globale du composé aromatique.

10/ - Composé aromatique selon la revendication 9, caractérisé en ce que le(les) substituant(s) hydrophobe(s) est(sont) un(des) groupement(s) alkyle(s) de chaîne principale comprenant au maximum trois atomes de carbone.




6/ - Composé aromatique selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le groupement protecteur enzymolabile est un groupement de nature à être déprotégé par une(des) réductase(s) intracellulaire(s).

7/ - Composé aromatique selon la revendication 6, caractérisé en ce que le groupement protecteur enzymolabile présente la formule générale suivante :



où R''' est choisi parmi un des groupements suivants :



8/ - Composé aromatique selon la revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'analogue stable du phosphate est choisi parmi l'un des groupements suivants :

- le méthylènegphosphate,
- le difluorométhylènegphosphate,
- le monofluorométhylènegphosphate.

9/ - Composé aromatique selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'un atome d'hydrogène d'au moins un des atomes de carbone d'au moins un des maillons aromatiques est substitué par un substituant, dit substituant hydrophobe, adapté pour améliorer l'hydrophobicité globale du composé aromatique.

10/ - Composé aromatique selon la revendication 9, caractérisé en ce que le(les) substituant(s) hydrophobe(s) est(sont) un(des) groupement(s) alkyle(s) de chaîne principale comprenant au maximum trois atomes de carbone.

11/ - Composé aromatique selon l'une des revendications 1 à 10, pour ses utilisations non-thérapeutiques comme agent inhibiteur de l'activité des aldolases de classe I.

12/ - Composé aromatique selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il présente une constante d'inhibition  $K_i$  inférieure à 25  $\mu\text{M}$ , notamment inférieure à 50 nM, typiquement de l'ordre de 25 nM.

13/ - Composé aromatique selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il est susceptible d'inhiber au moins une aldolase de façon irréversible ou quasi irréversible.

14/ - Procédé d'inhibition d'aldolases extracellulaires ou intracellulaires, à l'exception des aldolases intracellulaires de cellules vivantes non isolées d'un corps humain ou animal, ou d'un embryon humain, caractérisé en ce qu'on met lesdites aldolases au contact d'au moins un composé aromatique selon l'une des revendications 1 à 13, au moins en quantité suffisante pour induire un effet notable.

15/ - Procédé selon la revendication 14, appliqué à l'inhibition de la glycolyse cellulaire.

16/ - Procédé selon la revendication 14 ou 15, appliqué pour enrayer le développement d'une cellule cancéreuse.

17/ - Médicament comprenant un composé aromatique selon l'une des revendications 1 à 13.

18/ - Utilisation d'un composé selon l'une des revendications 1 à 13, pour la fabrication d'un médicament pour le traitement du cancer.

19/ - Utilisation selon la revendication 18, pour la fabrication d'un médicament pour le traitement du cancer s'effectuant selon l'approche GRH.

20/ - Procédé de synthèse d'un composé aromatique selon l'une des revendications 1 à 13.

11/ - Composé aromatique selon l'une des revendications 1 à 10, pour ses utilisations non-thérapeutiques comme agent inhibiteur de l'activité des aldolases de classe I.

12/ - Composé aromatique selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il présente une constante d'inhibition  $K_i$  inférieure à 25  $\mu\text{M}$ , notamment inférieure à 50 nM, typiquement de l'ordre de 25 nM.

13/ - Composé aromatique selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il est susceptible d'inhiber au moins une aldolase de façon irréversible ou quasi irréversible.

14/ - Procédé d'inhibition d'aldolases extracellulaires ou intracellulaires, à l'exception des aldolases intracellulaires de cellules vivantes non isolées d'un corps humain ou animal, ou d'un embryon humain, caractérisé en ce qu'on met lesdites aldolases au contact d'au moins un composé aromatique selon l'une des revendications 1 à 13, au moins en quantité suffisante pour induire un effet notable.

15/ - Procédé selon la revendication 14, appliqué à l'inhibition de la glycolyse cellulaire.

16/ - Procédé selon la revendication 14 ou 15, appliqué pour enrayer le développement d'une cellule cancéreuse.

17/ - Médicament comprenant un composé aromatique selon l'une des revendications 1 à 13.

18/ - Utilisation d'un composé selon l'une des revendications 1 à 13, pour la fabrication d'un médicament pour le traitement du cancer.

19/ - Utilisation selon la revendication 18, pour la fabrication d'un médicament pour le traitement du cancer s'effectuant selon l'approche GRH.

20/ - Procédé de synthèse d'un composé 1-hydroxy-2-naphtaldéhyde phosphorylé sur un atome de carbone du deuxième maillon aromatique, selon la revendication 1, dans lequel on réalise une étape de phosphorylation d'un composé 2-naphtaldéhyde dihydroxylé, hydroxylé sur

21/ - Procédé de synthèse selon la revendication 20, pour la synthèse d'un 1-hydroxy-2-naphtaldéhyde phosphorylé sur un atome de carbone du deuxième maillon aromatique.

22/ - Procédé de synthèse selon la revendication 21, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de phosphorylation d'un composé 2-naphtaldéhyde dihydroxylé, hydroxylé sur l'atome de carbone 1 du premier maillon aromatique et sur un des atomes de carbone du second maillon aromatique, ladite phosphorylation correspondant à une substitution du groupement hydroxyle du second maillon aromatique par un groupement phosphate.

23/ - Procédé de synthèse selon la revendication 22, caractérisé en ce que la phosphorylation est initiée par la technique du triéthyl phosphite, pyridine et iode, dans une solution de  $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{THF}$ .

24/ - Procédé de synthèse selon la revendication 22 ou 23, caractérisé en ce qu'il est effectué sur le 1,6-dihydroxy-2-naphtaldéhyde pour conduire au 5-formyl-6-hydroxy-2-naphtylphosphate.

l'atome de carbone 1 du premier maillon aromatique et sur un des atomes de carbone du second maillon aromatique, ladite phosphorylation correspondant à une substitution du groupement hydroxyle du second maillon aromatique par un groupement phosphate.

5                    21/ - Procédé de synthèse selon la revendication 20, caractérisé en ce que la phosphorylation est initiée par la technique du triéthyl phosphite, pyridine et iode, dans une solution de  $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{THF}$ .

                  22/ - Procédé de synthèse selon la revendication 20 ou 21, caractérisé en ce que la phosphorylation se réalise sur le 1,6-dihydroxy-2-naphtaldéhyde pour conduire au 5-formyl-6-hydroxy-2-naphtylphosphate.

10



**DÉPARTEMENT DES BREVETS**

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S)** Page N° 1 . / . 2.

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 270601

<b>Vos références pour ce dossier (facultatif)</b>	UN643-BF9789 JP/SF
<b>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL</b>	0308042

**TITRE DE L'INVENTION** (200 caractères ou espaces maximum)

NOUVEAUX COMPOSES AROMATIQUES INHIBITEURS DES ALDOLASES,  
PROCEDE DE SYNTHÈSE ET APPLICATIONS.

**LE(S) DEMANDEUR(S) :**

UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III  
Etablissement à caractère scientifique,  
culturel et professionnel  
118 route de Narbonne  
31062 TOULOUSE CEDEX 4  
FRANCE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.)  
Etablissement public doté de  
la personnalité civile et  
de l'autonomie financière  
3 rue Michel-Ange  
75016 PARIS (FRANCE)

UNIVERSITE DE MONTREAL  
Personne morale légalement  
constituée selon le droit  
canadien  
2900 boulevard Edouard-  
Montpetit  
H3T 1J4 MONTREAL, QUEBEC  
CANADA

**DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :**

<b>1</b>	Nom	DAX
	Prénoms	Chantal
	Adresse	Rue
		Code postal et ville
		9 rue Arsène d'Arsonval 31200 TOULOUSE (FRANCE)
	Société d'appartenance (facultatif)	
<b>2</b>	Nom	BLONSKI
	Prénoms	Casimir
	Adresse	Rue
		Code postal et ville
		17 rue Romain Rolland 31520 RAMONVILLE (FRANCE)
	Société d'appartenance (facultatif)	
<b>3</b>	Nom	AZEMA
	Prénoms	Laurent
	Adresse	Rue
		Code postal et ville
		Lieu-dit "Lycéry" 31190 AUTERIVE (FRANCE)
	Société d'appartenance (facultatif)	

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

**DATE ET SIGNATURE(S)** Toulouse, le 2 juillet 2003  
**DU (DES) DEMANDEUR(S)** Le Mandataire

**OU DU MANDATAIRE**  
(Nom et qualité du signataire)

Christian LASSIAILLE - CPI N° 92.1137

CABINET  
BREVET  
D'INVENTION  
S.A.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
95, rue des Amis, 31000 TOULOUSE

**ARTICLE 116 DES BREVETS**

116, rue de Saint Pétersbourg

50 Paris Cedex 08

phone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S)** Page N° 2 / 2.

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 270601

Des références pour ce dossier (facultatif)	UN643-BF9789 JP/SF
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL	0308042

**TITRE DE L'INVENTION** (200 caractères ou espaces maximum)

NOUVEAUX COMPOSES AROMATIQUES INHIBITEURS DES ALDOLASES,  
PROCÉDE DE SYNTHÈSE ET APPLICATIONS.

**DE(S) DEMANDEUR(S) :**

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III  
Établissement à caractère scientifique,  
culturel et professionnel  
118 route de Narbonne  
31062 TOULOUSE CEDEX 4  
FRANCE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.)  
Établissement public doté de  
la personnalité civile et  
de l'autonomie financière  
3 rue Michel-Ange  
75016 PARIS (FRANCE)

UNIVERSITÉ DE MONTREAL  
Personne morale légalement  
constituée selon le droit  
canadien  
2900 boulevard Edouard-  
Montpetit  
H3T 1J4 MONTREAL, QUEBEC  
CANADA

**DÉSIGNED(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :**

1	Nom	SYGUSCH
	Prénoms	Jurgen
Adresse	Rue	4195 Harvard
	Code postal et ville	H4A 1Z8 MONTREAL, QUEBEC (CANADA)
Société d'appartenance (facultatif)		
2	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
3	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

**DATE ET SIGNATURE(S)** Toulouse, le 2 juillet 2003  
**DU (DES) DEMANDEUR(S)** Le Mandataire  
**OU DU MANDATAIRE**  
(Nom et qualité du signataire)

CABINET  
BARTHELEMY  
& ASSOCIES

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
95, rue des Américains 31000 TOULOUSE

Christian LASSIAILLE - CPI N° 92.1137

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**